



QUE FAIRE LORS D'UNE DÉCOUVERTE D'UN RÉSIDENT BMR ?

Yann Ollivier – IDE hygiéniste ARLIN Nord Pas de Calais

Qu'est-ce qu'une BMR ?

- **Une bactérie est multirésistante** lorsqu'elle n'est plus sensible qu'à un petit nombre d'antibiotiques habituellement actifs en thérapeutique

- Les BMR les plus fréquentes sont :
 - *Staphylococcus aureus* Résistant à la Méricilline (SARM)
 - Entérobactérie productrice de BêtaLactamase à Spectre Etendu (EBLSE)

Résident porteur de BMR

- Découverte d'une BMR chez un résident :
 - ▣ lors d'un prélèvement à visée diagnostic (ex: ECBU chez une personne symptomatique.)
 - ▣ lors d'un prélèvement de dépistage (à l'occasion d'une hospitalisation par ex)

2 situations possibles :

Colonisation

Pas de signe

Pas de traitement

Infection


Signes présents

traitement indiqué

Mode de transmission

Facteurs de risque d'acquisition des BMR :

- Exposition aux antibiotiques
- Non respect des précautions standard




Gestion des BMR en EMS : Quelle spécificité ?

- EHPAD / MAS - FAM = lieux de vie avant tout
- Mais ce sont aussi des lieux de vie en collectivité
- Et un lieu de soin...

Respect des Précautions standard Hygiène des mains

- Réaliser une désinfection des mains avec un Produit Hydro Alcoolique (PHA)
- Pour le résident : Veiller au respect de l'hygiène des mains du résident



- Si mains visiblement souillées ou mouillées, réaliser un lavage au savon doux suivi d'une friction avec un PHA

Respect des Précautions standard

Port de gants à usage unique

- Porter des gants de soins non stériles à usage unique lorsqu'il y a :
 - risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques (selles, urines, crachats...)
 - des plaies, des muqueuses, du matériel souillé
 - systématiquement en cas de lésions cutanées

1 paire de gants = 1 soin
= 1 geste d'hygiène des mains



Respect des Précautions standard

Gestion des excréta



- Manipuler les bassins et urinaux avec des gants et une tenue de protection



- Utiliser un bassin à usage unique ou dédié au résident



- Eliminer systématiquement les gants et la tenue de protection après manipulation

Respect des Précautions standard

Gestion du linge

- Manipuler le linge souillé avec des gants et une tenue de protection
- Evacuer immédiatement dans les chariots de tri du linge
- Entretien en machine à laver
 - ▣ Si $t^{\circ} >$ ou $=$ à 60°C pas de traitement spécifique utile
 - ▣ Pour le linge délicat, il est possible de proposer un double cycle de lavage à froid



Respect des Précautions standard

Gestion des déchets



- « Les déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) issu d'un patient en précautions complémentaires de type contact **ne sont pas considérés** comme des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI). »

(Prévention de la transmission croisée : Précautions complémentaires contact- Consensus formalisé d'experts – SFHH – Avril 2009 recommandation 111)

Précautions complémentaires aux précautions standard

□ Protection de la tenue



- Porter une tenue de protection (tablier plastique à usage unique) systématiquement lors de **soin avec contact direct** avec le patient ou son environnement proche

- Rappel : Précaution standard : port d'une tenue de protection lors de soins « souillant – mouillants »

Précautions complémentaires aux précautions standard

□ Matériel de soin à usage unique

- Limiter le stock de matériel de soins entrant dans la chambre du résident au strict nécessaire,
- Ne pas jeter systématiquement le consommable non utilisé (sauf si visuellement sale)

□ Matériel de soins réutilisable

- Privilégier le matériel dédié au patient pendant sa prise en charge
- Si nécessité de le sortir de la chambre :
 - Réaliser un nettoyage et une désinfection préalable avec une chiffonnette imprégnée de Détergent-Désinfectant
 - Ou le transporter dans un emballage étanche et fermé avant son nettoyage et sa désinfection



Précautions complémentaires aux précautions standard

- **Entretien de l'environnement**
- Renforcer le bionettoyage de l'environnement proche du résident (surfaces hautes) : barres de lit, télécommande, cloche d'appel, adaptable, poignées ou accoudoirs ...avec un produit détergent-désinfectant



Autres mesures utiles (1)



- **Inform**er tous les professionnels de santé et le résident du type de précautions à respecter ainsi que les visiteurs



- **Signaler** le type de précautions (PCC) dans le dossier du résident (étiquette...), au niveau du planning mural de l'EHPAD, des courriers de transfert...

Autres mesures utiles (2)

- Laisser le résident sortir de sa chambre :



- « Il est recommandé de ne pas confiner systématiquement dans sa chambre un patient susceptible de déambuler auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. »

Recommandation R101 - « Prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact. SFHH. 2009 »

- Organiser et globaliser les soins délivrés au résident (prise en charge en dernier...)

Autres mesures utiles (3)

- Intervenants extérieurs :

- Les informer
- Doivent respecter les mêmes précautions que les soignants de l'EHPAD

- Transfert du résident :



- Informer la structure d'accueil pour qu'elle respecte les précautions complémentaires
- Les agents de transport doivent respecter les précautions standard

Et pour la famille et les visiteurs ?

- Les informer
- Leur proposer de réaliser un lavage des mains au savon ou une désinfection des mains avec un PHA

Il n'y a pas d'autres précautions à observer