

Conduite à tenir en cas de cluster d'infections respiratoires aiguës en Établissement et Services Médico-Sociaux



Application des Précautions Standard

Hygiène des mains par friction hydroalcoolique +++ par les professionnels, résidents, intervenants extérieurs et visiteurs :

- Entrée/sortie de la structure et de la chambre
- Avant/après tout contact avec un résident et toute activité collective



Mise en place des PC gouttelettes



- Port de masque chirurgical avant d'entrer dans la chambre
- Port d'un masque FFP2 si risque d'aérosolisation et tout professionnel à risque de forme grave

Port des EPI



Masque chirurgical :

- Systématique pour les professionnels et les visiteurs
- Pour les résidents symptomatiques, si possible, bien porté et en dehors de la chambre

Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Toute manipulation du masque entraîne son changement.



FFP2 sauf forme KN95 :

- Manœuvre à risque d'aérosolisation : (Exemple : aérosolthérapie, kiné respiratoire, ventilation pression positive continue, aspiration endotrachéale...)
- Professionnels à risque de forme grave

Penser à faire le fit-check pour vérifier l'étanchéité ([ICI la vidéo](#))



Lunettes de protection : si risque de projection (soins rapprochés)

Nettoyer les lunettes de protection à l'aide d'un détergent désinfectant après chaque utilisation

Environnement, gestion du linge et des déchets



Aération, ventilation :

- Aérer le plus souvent possible, en particulier, les chambres des résidents symptomatiques et les salles communes
- S'assurer de l'entretien et du fonctionnement des systèmes de ventilation



L'utilisation des ventilateurs est proscrit dans les salles communes.

En cas de fortes chaleurs, une évaluation bénéfique/risque doit être faite au cas par cas, en tenant compte, de la nature des lieux, des personnes qui les occupent et de la technologie de rafraîchissement existante ou envisagée.

Entretien des locaux :

- S'assurer que le produit disponible dans la structure est virucide
- Renforcer le nettoyage : désinfection des surfaces fréquemment touchées par les résidents, les visiteurs et les personnels

Déchets, linge, vaisselle :
Circuit et traitement habituel





Dépistage

- Proposer un dépistage des virus en circulation à toute personne ayant des symptômes d'IRA
- Ne dépister que les personnes symptomatiques
 - Par TAG ou PCR selon le virus recherché et les moyens disponibles : si TAG ⊖ mais symptômes, confirmer par PCR et mettre en place les précautions en attendant les résultats
 - Par TAG Multiplex (Grippe, Covid-19, VRS) avant admission en EHPAD et maintien des dépistages si demande expresse de la structure d'aval en cas de transfert




Vie sociale

Activités collectives :

- Résident symptomatique : le maintenir en chambre pendant la durée des symptômes, 7 jours voire plus si persistance des signes cliniques hors toux résiduelle
- Si possible, port du masque pour la reprise des activités collectives
- Arrêter les repas en salle commune dès qu'il y a plus de 2 cas dans un même secteur géographique
- En cas d'épidémie non contrôlée, des mesures plus contraignantes peuvent être décidées par le directeur de la structure mais elles doivent être proportionnées et limitées dans le temps
- Les animations en groupe sont déconseillées le temps du cluster

Interactions sociales des professionnels :

- Professionnel(s) symptomatique(s) : port du masque en continu
- Distanciation physique : au moins 2 m dès que le port du masque est impossible
-  covoiturage, vestiaires, pauses, repas

Communication :

- Echanger avec les familles et les intervenants extérieurs
- Rappeler qu'il est préférable de reporter une visite en cas de symptômes d'infection



Vaccination

- Covid : il est possible de vacciner même en cours de cluster à condition de proposer un test
Si test ⊖ → vaccin. Si test ⊕ → report de 6 mois
- Coupler la vaccination Covid + grippe est recommandé par la Haute Autorité de Santé
- Ne pas vacciner les personnes symptomatiques



Signalement et demande d'appui

- Signaler si ⊕ de 3 cas d'IRA chez les résidents en 4 jours quel que soit le virus sur le portail national
- Appui : Veille sanitaire de l'ARS via ars-hdf-signal@ars.sante.fr, CPIas via cpias-hdf@chu-lille.fr



Décès et rites funéraires

Procédure habituelle

