

Antiseptiques à domicile

Adultes et enfants de plus de 30 mois

Les infirmiers sont autorisés depuis le 24 juillet 2019* à prescrire des solutions et produits antiseptiques. Pour la prévention du risque infectieux (PRI), il est recommandé de privilégier l'usage d'un antiseptique majeur (large spectre, action rapide).

*Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

A noter : Il n'y a pas d'indication à l'utilisation d'un antiseptique pour les glycémies capillaires (lavage des mains à l'eau et au savon) ni pour les injections d'insuline.

En cas de prise en charge en HAD, se référer aux procédures de la structure.

INDICATIONS	ANTISEPTIQUES	EXEMPLES	RECOMMANDATIONS	CONTRE INDICATIONS
Pose d'un CVP, d'un cathéter sous cutané, d'une aiguille sur CCI	Antiseptique alcoolique	Chlorexhidine alcoolique 2% ou Povidone iodée alcoolique 5% TC (Temps de contact) : 30sec Conservation : 30 j	2 passages successifs d'antiseptique	Œil Oreille Muqueuses
Réfection de pansement			Nettoyer, Rincer, Sécher 1 passage d'antiseptique	
Retrait d'une aiguille sur CCI			1 passage d'antiseptique	
Injection IM, IV, SC, prélèvement sanguin	Antiseptique alcoolique ou alcool 70%	Chlorexhidine alcoolique 2% ou Povidone iodée alcoolique 5% TC : 30 sec Conservation : 30 j	1 passage d'antiseptique ou alcool 70%	Muqueuses Plaies
Pose de sonde vésicale, sondage évacuateur isolé, AES	Antiseptique aqueux	Dakin 0.5% TC : 1min Conservation : 30 j Amukine 0.06% TC : 1min Conservation : 30 j	Nettoyer, Rincer, Sécher 1 passage d'antiseptique	Oeil
Valves bidirectionnelles	Alcool 70%	Alcool 70% TC : 30sec	Frictionner 15 sec minimum septum et pas de vis	

Les principes fondamentaux :

- Surveiller la tolérance locale et générale
- Utiliser un antiseptique alcoolique sur une peau saine et un antiseptique aqueux sur une peau lésée ou muqueuse
- **Ne pas utiliser la chlorhexidine** au contact de : œil, muqueuse génitale, conduit auditif, cavités internes (lavage, irrigation)
- **Respecter les dates de péremption** (30 jours après la date d'ouverture notée sur les flacons)
- **Evaluer l'état cutané** : appliquer l'antiseptique sur une peau ou muqueuse propre
- Appliquer l'antiseptique du plus propre vers le plus sale
- Respecter le mode d'emploi : l'action mécanique, le temps de contact et de séchage spontané
- **Pour l'enfant de moins de 30 mois**, « Guide de bonnes pratiques de l'antisepsie chez l'enfant » SF2H ; 2007 et « Recommandations pour la PRI liées aux cathéters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatalogie » SF2H ; mai 2020