

VRS : Virus Respiratoire Syncytial

De quoi est-il responsable et quels sont les symptômes ?

Ce virus est responsable de la bronchiolite. Les symptômes possibles sont :

- Rhinorrhée, obstruction nasale, éternuements
- Toux, Pharyngite
- Atteinte respiratoire
- Céphalées, fièvre inconstante, asthénie



Comment se transmet-il ?

- Transmission directe par voie respiratoire et indirecte par les mains et les objets souillés




Quel est le traitement ?

- Traitement symptomatique à domicile le plus souvent
- Hospitalisation si critères de gravité ou complications



Quelles sont les mesures de prévention ?

- Hygiène des mains
- Port du masque si symptômes
- Aération régulière des locaux
- Vaccination des femmes enceintes (3ème trimestre) et des personnes âgées >75 ans (ou 65 ans si fragilités), immunisation des nourrissons



Qui et comment protéger ?



FEMMES ENCEINTES, NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS	PERSONNES >75 ANS OU > 65 ANS PRÉSENTANT UNE PATHOLOGIE CARDIAQUE OU RESPIRATOIRE CHRONIQUE
• Vaccination par ABRYSSVO®, 1 dose, entre 32 et 36 SA chez la mère (protection de l'enfant à naître) • Immunisation passive par BEYFORTUS® ou SYNAGIS® chez le nouveau-né et nourrisson	• Vaccin AREXVY® ou ABRYSSVO® : 1 dose

- [Bulletin N°8 – Fin Août 2023 spécial Nirsevimab ou Beyfortus®](#)
- [DGS - URGENT 2024-18 - Modalités de mise en oeuvre de la campagne d'immunisation des nouveau-nés contre les infections à virus respiratoires syncytial \(VRS\)](#)