Précautions complémentaires respiratoires
Micro-organismes de catégorie B *
Ventilation CONFORME

CPias Hauts-de-France

Hygiène des mains: solution hydro-alcoolique

Avant et **après** contact avec le patient/résident ou avec son environnement
Avant et **après** le retrait des équipements de protection

Pour tous professionnels et visiteurs avant l'entrée en chambre

Masque FFP2 (retrait en dehors de la chambre)

Dans la chambre patient/résident

Port du masque par le patient/résident dès la présence d'une autre personne
Porte de la chambre fermée
Aération régulière et fréquente (15 min toutes les 2h)



Soins aérosolisants** ou risque de projections massives

FFP2 + surblouse doublée d'un tablier plastique + lunettes de protection

Port de gants adapté

Faire porter un masque au patient/Résident (FFP2 si possible) s'il sort de sa chambre. Limiter les sorties.

*Micro-organismes de catégorie B

Bactéries

Mycobacterium tuberculosis sensible (infection parenchymateuse pulmonaire, bronchique et/ou ORL)

Virus

- Varicelle-Zona-Virus (Varicelle et zona disséminé chez l'ID)
- Virus de la rougeole ou MeV (Measles virus)

**Exemples de soins aérosolisants

A risque élevé

- Aérosolthérapie
- Fibroscopie bronchique
- Intubation pour un patient non curarisé
- Manoeuvres de réanimation cardiopulmonaire
- Ventilation manuelle au masque facial
- Réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie
- Induction de crachats après aérosols de sérum physiologique hypertonique
- Procédures post-mortem utilisant des appareils rotatifs à grande vitesse

A risque modéré

- Aspirations des voies aériennes (endo-trachéales)
- Extubation
- Ventilation non invasive
- Gastroscopie avec aspiration des voies aériennes supérieures
- Procédures de chirurgie dentaire avec des appareils rotatifs à grande vitesse
- Procédures ORL proximales avec aspiration