

Précautions complémentaires respiratoires

Micro-organismes de catégorie C*

➔ Ventilation CONFORME

Hygiène des mains : solution hydro-alcoolique



Avant et **après** contact avec le patient/résident
ou avec son environnement

Avant le port et **après** le retrait des
équipements de protection



Pour tous professionnels et visiteurs avant l'entrée en chambre



Masque FFP2 (Retrait en dehors de la chambre)

Dans la chambre du patient/résident


Port du masque par le patient/résident dès la présence
d'une autre personne

Porte fermée

Aération régulière et fréquente (15 min toutes les 2h)

Espace à pression négative ou unité mobile d'air

Capteur de CO₂ : seuil de 800 ppm



Soins aérosolisants** ou risque de projections massives



FFP2 + surblouse doublée d'un tablier plastique
+ lunettes de protection




Port de gants adapté

Si possible, chambre à pression négative ou unité
mobile de traitement d'air

Faire porter un masque FFP2 au patient/résident s'il sort de sa chambre
Limiter les sorties





*Micro-organismes de catégorie C

Mycobacterium tuberculosis XDR



**Exemples de soins aérosolisants

A risque élevé

- Aérosolthérapie
- Fibroscopie bronchique
- Intubation pour un patient non curarisé
- Manœuvres de réanimation cardiopulmonaire
- Ventilation manuelle au masque facial
- Réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie
- Induction de crachats après aérosols de sérum physiologique hypertonique

A risque modéré

- Aspirations des voies aériennes (endo-trachéales)
- Extubation
- Ventilation non invasive
- Gastrosopie avec aspiration des voies aériennes supérieures
- Procédures de chirurgie dentaire avec des appareils rotatifs à grande vitesse
- Procédures ORL proximales avec aspiration