

Surveillance épidémiologique et prévention des infections respiratoires aiguës

Bilan 2025-2026 de l'épidémie d'IRA et couvertures vaccinales

Hélène Prouvost, Erwan Maraud, Marie Barrau
Agence nationale de Santé publique
Santé publique France – Hauts-de-France


14/10/2026

Bilan de la Surveillance des IRA 2025-2026

Santé publique France

Surveillance intégrée des infections respiratoires aiguës

Une surveillance multi-sources



Institut national de la statistique et des études économiques
Mesurer pour comprendre
Insee
Santé publique France
Inserm CépiDc

Orchidée
Santé publique France
INSTITUT PASTEUR
CNR Virus des infections respiratoires
HCL
Surveillance sentinelle en réanimation


Réseau Oscour®
Santé publique France

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DES FAMILLES, DE L'AUTONOMIE, ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Portail de signalement des événements sanitaires indésirables
Santé publique France

MÉDECINS FRANCE
Sentinelles
Réseau Sentinelles
INSTITUT PASTEUR
CNR Virus des infections respiratoires
HCL
RELAB Laboratoires
INSTITUT PASTEUR
CNR Virus des infections respiratoires
HCL

SUM'EAU :
+ grippe en 2026-27
Santé publique France
anses

Bilan saison épidémique 2025-2026




Covid-19

Augmentation de l'activité en médecine de ville et aux urgences fin août – début septembre 2025 **(S35-2025).**

Pic début octobre 2025 **(S40-2025)**, suivi d'une baisse progressive jusqu'à début novembre **(S45-2025)**.

Stabilisation à des niveaux très faibles par la suite.

Dynamique similaire à 2024-2025, mais avec des niveaux d'activité globalement inférieurs.



Bronchiolite < 1 an


Phase épidémique

De début décembre (**S48-2025**)
À mi-février (**S02-2026**)
Pic épidémique :
Début décembre (**S49-S50-2025**)

7 semaines d'épidémie

Contre 11 semaines en moyenne (2015-2025).

Et 9 semaines pour la saison précédente.



Grippe

Phase épidémique

De début décembre (**S49-2025**)
À mi-février (**S07-2026**)
Pic épidémique :
Début janvier aux urgences et mi-janvier en médecine de ville

11 semaines d'épidémie


Contre 10 semaines en moyenne (2015-2025).

Et 13 semaines pour la saison précédente.

Pour en savoir plus
www.santepubliquefrance.fr/sites/default/files/2026-05/bullreg_ira_hdf_20260507.pdf

Dynamiques épidémiques des IRA


Consultations SOS Médecins



Part des IRA parmi les Consultations SOS Médecins Dernière semaine disponible

2026-2027 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022

Passages aux urgences




Part des IRA parmi les passages aux urgences Dernière semaine disponible

2026-2027 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022


Episode d'IRA en ESMS

Santé publique France


Episode : 3 cas d'IRA en 4 jours








Expérimentation PISA IRA



Passages aux urgences



- **Recommandations port du masque** :

Déclenchement :


✓Seuil modéré

✓ Analyse contextualisée

Levée : seuil faible + 2 semaines

Approche PISA IRA = outil d'aide à la décision

à mettre en regard d'une analyse territoriale pour déclencher la mesure (tensions hospitalières, cas groupés d'IRA en EMS, etc.)



Retex SpFrance, ARS, DGS
1er semestre 2026

Santé publique France

Couvertures vaccinales femmes enceintes, séniors et adultes à risque



POUR EN SAVOIR PLUS
www.santepubliquefrance.fr/sites/default/files/2026-10/bullreg_vaccination_2025_hdf_20261008.pdf


Santé publique France



Femmes enceintes

La vaccination : un double bouclier pour la mère et l'enfant

Quatre vaccinations sont recommandées pendant la grossesse : contre la coqueluche et le virus respiratoire syncytial (VRS) responsables de la bronchiolite, la grippe et la Covid-19.
Elles contribuent à protéger la femme enceinte et son bébé dès ses premiers jours de vie.



Coqueluche

femmes ayant accouché en 2025 ont été vaccinées pendant leur grossesse



Infections à virus respiratoires syncitial (VRS)

femmes enceintes éligibles pendant la campagne 2025-26 d'immunisation contre le VRS ont été vaccinées

Si la mère n'a pas été vaccinée, le nourrisson peut être protégé dès la naissance par l'injection d'anticorps monoclonaux.

Grippe et Covid-19

Données sous-estimées
Grippe : 26 % HdF
Covid-19 : 6 % France

Séniors et personnes à risques



À partir de 65 ans et pour les personnes à risque, la vaccination permet de prévenir les infections et leurs complications.
Les vaccins contre la grippe, la Covid-19, les infections à pneumocoques, le zona et le VRS sont recommandés. Un rappel DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite) est également recommandé tous les 10 ans à partir de 65 ans

En 2024, **81 %** des 65-79 ans se déclarent favorables à la vaccination en général




Grippe

personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées



Infections à pneumocoques

personnes 65 ans et plus à risque de formes sévères sont à jour de leur vaccination



Covid-19

personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées

Résidents et professionnels en établissements médico-sociaux




En établissement médico-social, la vaccination est un levier essentiel de protection.
En complément des gestes barrières, les vaccinations contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels contribuent à limiter la circulation des virus et à protéger les plus fragiles.



Grippe

résidents en Ehpad
ont été vaccinés



Covid-19

résidents en Ehpad
ont été vaccinés



Grippe

professionnels exerçant en Ehpad
ont été vaccinés


Grippe (2024-2025)

Professionnels des établissements de santé
23 % en Hauts-de-France (source IQSS - HAS)

Santé publique France

Bulletin IRA et Visualisation interactive des données


Odissé
Open Data des Indicateurs en Santé
Nos données
Nos visualisations
Votre région
Glossaire
Vos outils
Les infections respiratoires aiguës
Chaque année, plusieurs virus respiratoires, comme les virus grippaux, le VRS (virus respiratoire syncytial) ou le SARS-CoV-2, sont à l'origine d'épidémies. Ces infections, favorisées par le froid et les rassemblements en intérieur, touchent particulièrement les personnes fragiles : personnes âgées, nourrissons et personnes souffrant de maladies chroniques. Santé publique France assure une surveillance continue de ces infections, renforcée pendant la saison hivernale dans l'Hexagone.
Odissé - Les infections respiratoires aiguës
Le Bulletin interactif
Explorer les graphiques interactifs du Bulletin hebdomadaire
Choisissez une source de surveillance
ÉPIDÉMIES HIVERNALES
Les tendances de la semaine
La situation épidémiologique de la semaine
→ SEMAINE 40
Infections respiratoires aiguës (IRA)
Indicateurs globalement stables et à leur niveau de base.
Grippe
Ensemble des indicateurs à leur niveau de base. Détections sporadiques de virus grippaux.
Bronchiolite
Ensemble des indicateurs à leur niveau de base. Détection de rhinovirus susceptibles d'induire des bronchiolites dans l'Hexagone.
COVID-19
Circulation active du SARS-CoV-2 avec un faible impact sur le recours aux soins.
Téléchargez le Bulletin hebdomadaire national (.pdf)
À retenir cette semaine :
En semaine 40, l'activité pour IRA était à son niveau de base en ville et à l'hôpital. Elle était principalement portée par les rhinovirus et le SARS-CoV-2, et dans une moindre mesure la grippe. Les indicateurs syndromiques progressaient légèrement depuis plusieurs semaines mais tendaient à se
Alerte épidémique
Grippe
Niveau d'alerte régional
Bronchiolite
Niveau d'alerte régional
COVID-19
Taux de passage aux urgences
Épidémie
Pré-épidémie
Post-épidémie
Pas d'épidémie
Non communiqué
Antilles, Guyane : niveau d'alerte pour la semaine précédente.
< 0,25 %
< 0,50 %
< 1 %
< 2 %
≥ 2 %
Semaine sélectionnée : S40 (du 28 septembre au 4 octobre) - 2026
S36
S41
La situation épidémiologique de chaque région


Espace presse
Portail documentaire
Contenus accessibles
Français
English
Santé publique France
IO ANS
Rechercher une actualité, une publication...
DOCUMENTS DE PRÉVENTION
ODISSÉ
A LA UNE
NOS THÉMATIQUES A-Z
RÉGIONS ET TERRITOIRES
ACTUALITÉS
NOS SITES SERVICES
PUBLICATIONS ET ENQUÊTES
QUI SOMMES NOUS ?
NIVEAU RÉGIONAL
Suivre l'actualité de nos cellules régionales en recevant les dernières publications de votre région.
RÉGIONS
Grand Est
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
CAPTCHA
QUEL ANIMAL MIAULE ?
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de courriels indésirables (spam) automatisées.
VALIDER MES ABONNEMENTS
En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiant la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, exercer ce droit en adressant un mail à : webmestre@santepubliquefrance.fr
Nos services
Santé Mentale info service
Vivre avec la chaleur
VACCINATION INFO SERVICE.FR
tabac info service
SEXOSAFE
QuestionSexualité
Santé publique France
Suivez-nous
RSS
S'ABONNER À NOS NEWSLETTERS
© Santé publique France 2026 - Tous droits réservés
Mentions légales
Cookies
Accessibilité (partiellement conforme)
Nous contacter
Plan du site

Merci !





- Services d'urgences du réseau Oscour® ;
- Associations SOS Médecins d'Amiens, Beauvais, Dunkerque, Lille, Roubaix-Tourcoing et Saint-Quentin ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques ;
- Réanimateurs (cas graves de grippe hospitalisés en réanimation) ;
- Personnels des Ehpad et autres établissements médico-sociaux (EMS) : épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) en EMS ;
- Laboratoires d'analyses et de biologie médicales et Centre national de Référence des virus respiratoires, Institut Pasteur, Paris ;
- Analyses virologiques réalisées au CHU de Lille et au CHU d'Amiens ;
- Réseau Bronchiolites Picard ;
- Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) Hauts-de-France ;
- Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France.





Santé publique France