

Précautions respiratoires en HAD

CPias Hauts-de-France

QUAND PORTER UN MASQUE ?

- Patient avec symptômes ORL, toux, fièvre…
- Dès l'entrée au domicile du patient

Si j'ai des symptômes : masque chirurgical en systématique (Précautions Standard)

Fiche pratique ICI



HYGIÈNE DES MAINS

FHA avant le port de masque et après son retrait



CHOIX DU MASQUE



Masque chirurgical :

si soins <15 mn ou port du masque par le patient pour les pathogènes de catégorie A



Masque FFP2 :

Faire le fit-check

- Si contact>15mn pour les pathogènes A
- Systématique pour les pathogènes B et C

BARBE

Le port d'une barbe réduit l'étanchéité du masque et diminue son efficacité.




LUNETTES DE PROTECTION/VISIÈRE

- En cas de soins aérosolisants ou risque de projection
- Après chaque utilisation, les nettoyer avec un détergent désinfectant
- Si à usage unique, jeter après utilisation



AÉRATION

Aération régulière du domicile (au minimum 10 mn)



VACCINATION



Elle permet de se protéger des formes graves et de protéger les personnes à risques. Respecter les recommandations vaccinales.

Calendrier vaccinal



LEXIQUE

CPias Hauts-de-France

*Micro-organismes de catégorie A

Bactéries

- *Neisseria meningitidis* (méningite)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Bordetella pertussis* et *B. parapertussis* (coqueluche)
- *Corynebacterium diphteriae*
- *Haemophilus influenzae* (infections respiratoires et méningite)
- *Chlamydia pneumoniae* (pharyngite, bronchite, pneumopathie)
- *Mycoplasma pneumoniae*

Virus

- *Myxovirus parainfluenzae parotidis* (Oreillons)
- SARS-CoV-2 (Covid-19)
- Adenovirus (infections respiratoires), virus parainfluenza
- Virus influenza (grippe)
- Virus respiratoire syncytial (bronchiolite…)
- Métapneumovirus
- Rhinovirus, coronavirus « saisonniers » hors SARS-CoV-2
- Bocavirus
- Rubivirus (rubéole)

*Micro-organismes de catégorie B

Bactéries

Mycobacterium tuberculosis sensible (infection parenchymateuse pulmonaire, bronchique et/ou ORL)

Virus

Varicelle-Zona-Virus (Varicelle et zona disséminé chez l'ID)
Virus de la rougeole ou MeV (Measles virus)

*Micro-organismes de catégorie C

Mycobacterium tuberculosis XDR (Multi-résistant aux antibiotiques)